

SUPLEMENTO A LA LISTA DE LAS ASTERACEAE DE VENEZUELA PUBLICADAS EN EL VOL. 11 N° 3-4

Victor M. Badillo

Laboratorio de Botánica Sistemática. Instituto de Botánica Agrícola.
Facultad de Agronomía. Universidad Central de Venezuela

En este Suplemento se agregan especies no mencionadas, así como también aquéllas cuyos géneros se consideran válidos y que habían sido citados de otro modo. La lista como tal fue elaborada a petición del Herbario Nacional, como contribución al Nuevo Catálogo de la Flora: según comunicación fue incorporada a la base de datos correspondiente. Por último se citan nuevos registros para las Asteraceae del país.

II MUTISIEAE

Chaptalia exscapa (Pers.) Baker, Martius Fl. Bras. 6(3): 379. 1884.
Nueva para el país. Estado Lara: entre E. Jabon y Buenos Aires, 2800 m s.n.m., 20-XII-1990. A. Boyer 26 (MY).

Chaptalia anisobasis S.T. Blake. Washington Acad Sci. 25: 2324. 1985.
Estado Mérida, Páramo de Santo Domingo, 3400 m s.n.m., 28-III-1999.
Berg. 98-35-14 (MY).

IV LACTUCEAE

Hypochoeris chillensis (Kunth) Hieron., Bot. Jahrb. Syst. 28: 658. 1901.
Apargia chillensis Kunth, HBK, Nov. Gen Sp. Pl 4: 3. 1818
Hypochoeris elata (Wedd.) Griseb., Wiss Goettingen 19: 198. 1874.

Hypochoeris echegarayi Hieron., Bol. Acad. Nac. Cordoba 4: 51. 1881
Hypochoeris setosa (Wedd) Rusby, Bull. New York Bot. Gard. 4: 402.
1907

Launaea intybacea (Jacq.) Beauverd, Bull. Soc. Bot. Geneve, ser II, ii: 114.
1910.
Lactuca intybacea Jacq., Ic. Rar, 1: 16. 1786.

Sonchus asper (L.) Hill, Herb. Brit. i: 47. 1769.

Sonchus oleraceus L., Sp. Pl. 2: 794. 1753.

Tolpis barbata (L.) Gaertn., Fruct. 2: 272. 1791.

Propia del Mediterráneo. Nueva para el país. Estado Trujillo: Parque Nacional Dinira, entre Mesa Arriba y Páramos Cendé y Jabón, 3100 m s.n.m. Duno et al. 1533 (MY).

V VERNONIEAE

Lepidaploa ruiz-teranii (Badillo) Badillo, nov. comb. Ernstia 20: 8. 1983.

Vernonia ruiz-teranii Badillo, Ernstia 20: 8. 1983. (Holotipo en MY).

Lepidaploa yuruanensis Badillo, Ernstia n.s. 10: 5. 2000.

VII PLUCHEEAE

Pseudoconyza Cuatrec.

Ernstia lyrata (Kunth) Badillo in Pittier et al. sine descri lat, in clavis. Cat. Fl. Venez. 2: 504. 1947.

Blumea viscosa (Miller) Badillo, Rev. Fac. Agr. Univ. Centr. Venezuela (Maracay) 7(3): 9. 1974.

Blumea aurita (L.f.) DC. Wight, Contr. Bot. Ind. 16. 1834.

Blumea viscosa (Miller) Badillo, Rev. Fac. Agr. Univ. Centr. Venezuela (Maracay) 7(3): 9. 1974.

VIII GNAPHALIEAE

Antennaria linearifolia Wedd., Chlor. And. 1: 150. 1856.

Nueva para el país: Estado Mérida, 4000 m s.n.m., Badillo 7553 (MY).

Parachionolaena colombiana (S.F. Blake) Dillon et Sagast., Arnaldoa 1(2): 44. 1992.

Chionolaena colombiana S.F. Blake, J. Washington. Acad. Sci. 25: 312. 1935. *Lucilia saxatilis* Badillo, Ernstia 50: 6. 1989.

IX ASTEREAE

Baccharis nitida (Ruiz et Pav.) Pers., Syn. Pl. 2: 425. 1807.

Conyza groegeri Badillo, Ernstia n.s. 10: 5. 2000.

Egletes repens Schinners, Lloydia 249. 1949. Estado Apure (según Pruski).

Egletes prostata (Sw.) Kuntze (no Kunth como figura en la lista anterior).

Egletes tenuifolia Cuatrec, Webbia 21: 27. 1969.

Nueva para el país. Estado Falcón T. Ruiz y R. Villafañe 4829 (MY).

XI SENECIONEAE

Lasiocephalus otophorus (Wedd.) Cuatrec., Phytologia 40(4): 311. 1975.

Nueva para el país. Estado Táchira, Páramo Tamá. G. Morillo y F. García 11402 (MY).

Scrobicaria aquifolia (Cuatrec) B. Nord., Opera Botánica 44: 64. 1978.

Pentacalia aquifolia (L.f.) Cuatrec. et H. Rob., Phytologia 76: 404. 1994.

XII HELIANTHEAE

Bidens odorata Cav., Ic.: 1.9, Tab. 13. 1791.

Calyptocarpus vialis Less., Syn. Gen. Comp. 321. 1832.

En los alrededores de Caracas., 900 m s.n.m. Angel Sánchez s.n.
7-VII-2001. (MY).

Melanthera nivea (L.) Small, Fl. S.E. United States 1251. 1903.

Melanthera aspera (Jacq.) Small, Bull. Torr. Bot. Club 36: 364. 1909.

Oyedaea hypomalaca (Steyerm.) M. Lapp, Ernstia n.s. 13 (3-4): 130. 2003.

Oyedaea verbesinooides var. *hypomalaca* Steyerm., Fieldiana Bot. 28(3): 664. 1953.

Oyedaea jahnii S.F. Blake, Contr. United States Nat. Herb. 80: 539. 1924.

Oyedaea maculata S.F. Blake, Contr. United States Nat. Herb. 16: 224. 1926.

Oyedaea niquitaensis Badillo et M. Lapp, Ernstia n.s. 13(3-4): 132. 2003.

Oyedaea peracuminata Badillo et M. Lapp, Ernstia n.s. 13(3-4): 138. 2003.

Oyedaea reticulata S.F. Blake: eliminar este nombre de la lista anterior.

Verbesina myriocephala Schultz-Bip. ex Klatt., Leopoldina 23: 144. 1887.

XIII EUPATORIEAE

Asplundianthus pseudoglomeratus R. King et H. Rob., Phytologia 30: 225. 1975. Edo. Táchira, entre el Mirador y alrededores de la Cueva del Descanso, vertiente occidental del Páramo de Tamá. Enero 1978, L. Ruiz Terán *et al.* 15115 (MY).

Barrosoa grossedentata Badillo, Ernstia n.s., 5(3): 135. 1995.

Cronquistianthus sp. Edo. Mérida, Distrito Campo Elías, vía hacia el Páramo de Quirorá, 1900 m s.n.m. 4-XII-1999. V. Badillo y C. Benítez de Rojas 7511 (MY).

Mikania congesta DC., Prodr. 5: 197. 1836.

Mikania miconioides B. Rob., Contr. Gray Herb. 61: 19. 1920.

Mikania rondonensis Badillo, Bol. Soc. Venez. Cienc. Nat. 10: 297. 1946.