

ANEXOS



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO
SOCIAL DEL TRABAJO
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
HOSPITAL GENERAL DEL ESTE "DR. DOMINGO LUCIANI"
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
POSTGRADO DE ANESTESIOLOGIA

ANEXO 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo _____ Titular de la Cédula de Identidad
Nº. _____, como representante legal del (la) pacientes:

_____ Acepto que mi representado-a sea incluido (a) en
el estudio: **EFICIENCIA DE LA PREMEDICACIÓN POR VÍA ORAL EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS ENTRE MIDAZOLAM Y CLONIDINA.** Que será desarrollado por
Ronald Gutiérrez y Valentina Lameda, médicos del hospital Dr. Domingo Luciani y cuyo
objetivo es: Comparar la eficiencia entre midazolam y clonidina aplicado en premedicación
por vía oral a pacientes pediátricos sometidos a cirugía electiva en el Hospital Domingo
Luciani desde febrero a septiembre de 2017.

Entiendo y acepto que se me entregará un sobre sellado identificado con una de estas letras (A
o B) y que contiene una opción de grupo de fármaco del estudio a administrar por vía oral. El
sobre será sellado y anexado a la historia del paciente hasta finalizar la recolección de
muestras. Esta información será de carácter confidencial y para los resultados de la
investigación.

Afirmo que se me permitió hacer preguntas, y que entendí claramente los objetivos del
protocolo.

En constancia firmo, Fecha _____
_____ Representante: Padre () Madre () Otro () _____

_____ Testigo,

_____ Médico Investigador



**MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO
 SOCIAL DEL TRABAJO
 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
 HOSPITAL GENERAL DEL ESTE "DR. DOMINGO LUCIANI"
 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
 POSTGRADO DE ANESTESIOLOGIA**

ANEXO 2.

Datos de los pacientes. Hospital Dr. Domingo Luciani 2017

EDAD:		PESO:		IMC:		ASA:	
GRUPOS DE PACIENTES							
A: Midazolam				B: Clonidina			
CONTROLES (minutos):		10		15		30	
Frecuencia cardíaca							
Presión arterial							
Escala Actitud	min	Agitado-a 1 pto.	Tranquilo-a 2 ptos		Somnoliento-a 3 ptos		Dormido-a. 4 ptos
	10						
	15						
	30						
Escala Aceptación	min	Buena 3 ptos		Difícil 2 ptos		Rechazo 1 pto	
	10						
	15						
	30						
Escala RAMSAY	min	1	2	3	4	5	6
	10						
	15						
	30						
COMPLICACIONES							
Depresión				Hipotensión			
Paradas respiratorias				Bradicardia			
Nauseas							
Otros:							

ANEXO 3.

Escala de Ramsay

GRADO	RESPUESTA
1	AGITACIÓN, ANSIEDAD
2	CALMADO, ORIENTADO
3	RESPUESTA A ÓRDENES
4	DORMIDO, (responde a estímulos)
5	DORMIDO, (respuesta débil)
6	SIN RESPUESTA AL DOLOR

ANEXO 4

Tabla 1. Tabla de Frecuencias para edad según Grupos

Edad	Midazolam		Clonidina		P-Valor
	Freq	%	Freq	%	
2 años	3	12 %	2	8 %	0,9994
3 años	4	16 %	5	20 %	
4 años	6	24 %	6	24 %	
5 años	2	8 %	2	8 %	
6 años	5	20 %	5	20 %	
7 años	1	4 %	1	4 %	
8 años	4	16 %	4	16 %	
Total general	25	100 %	25	100 %	

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de SPSS V 18.0

ANEXO 5

Tabla 2. Tabla de Frecuencias para peso según Grupos

Estadísticas	Peso		P-Valor
	Midazolam	Clonidina	
Promedio	16,64	16,54	0,9306
Mediana	16	16	
Máximo	26	26,5	
Mínimo	11	11	
Desviación	4,12	4,27	

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de SPSS V 18.0

ANEXO 6

Tabla 3. Tabla de Frecuencias para ASA según Grupos

ASA	Midazolam		Clonidina		P-Valor
	Freq	%	Freq	%	
I	15	60	12	48	0,3946
II	10	40	13	52	
Total general	25	100 %	25	100 %	

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de SPSS V 18.0

ANEXO 7

Tabla 4. Tabla de Frecuencias para actitud según Grupos

Tiempo	Actitud	Midazolam		Clonidina		P-Valor
		Freq	%	Freq	%	
0	Agitado	9	36 %	9	36 %	1
	Tranquilo	15	60 %	15	60 %	
	Somnoliento	1	4 %	1	4 %	
10	Agitado	5	20 %	7	28 %	0,7981
	Tranquilo	18	72 %	16	64 %	
	Somnoliento	2	8 %	2	8 %	
15	Agitado	1	4 %	2	8 %	0,6965
	Difícil	0	0 %	1	4 %	
	Tranquilo	20	80 %	18	72 %	
30	Somnoliento	4	16 %	4	16 %	0,829
	Tranquilo	17	68 %	15	60 %	
	Somnoliento	7	28 %	9	36 %	
	Dormido	1	4 %	1	4 %	
P-Valor		0,0056		0,0062		

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de SPSS V 18.0

ANEXO 8

Tabla 5. Tabla de Frecuencias para aceptación según Grupos

Tiempo	Aceptación	Midazolam		Clonidina		P-Valor
		Freq	%	Freq	%	
0	Buena	6	24 %	7	28 %	0,9432
	Dificultosa	6	24 %	6	24 %	
	Rechazo	13	52 %	12	48 %	
10	Buena	12	48 %	11	44 %	0,9531
	Dificultosa	9	36 %	10	40 %	
	rechazo	4	16 %	4	16 %	
15	Buena	20	80 %	20	80 %	1
	Dificultosa	3	12 %	3	12 %	
	rechazo	2	8 %	2	8 %	
30	Buena	24	96 %	25	100 %	0,3124
	Dificultosa	1	4 %	0	0 %	
P-Valor		0,0000002		0,0000009		

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de SPSS V 18.0

ANEXO 9

Tabla 6. Tabla de Frecuencias para Ramsay según Grupos

Tiempo	Ramsay	Midazolam		Clonidina		P-Valor
		Freq	%	Freq	%	
0	Agitación	19	76%	17	68%	0,5287
	Calmado	6	24%	8	32%	
10	Agitación	5	20%	11	44%	0,1903
	Calmado	16	64%	11	44%	
	Respuesta	4	16%	3	12%	
15	Agitación	1	4%	1	4%	0,3988
	Calmado	12	48%	8	32%	
	Respuesta	12	48%	14	56%	
	Dormido (resp estímulos)	0	0%	2	8%	
30	Calmado	5	20%	4	16%	0,1955
	Respuesta	18	72%	13	52%	
	Dormido (resp estímulos)	2	8%	7	28%	
	Dormido (resp débil)	0	0%	1	4%	
P-Valor		0,0000002		0,0000006		

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de SPSS V 18.0

ANEXO 10

Tabla 7. Tabla de Frecuencias para datos hemodinámicos según Grupos

Tiempo	Estadísticas	Frecuencia Cardíaca		Presión Arterial	
		Midazolam	Clonidina	Midazolam	Clonidina
0	Promedio	92,28	92,12	66/21	67/21
	Mediana	90	90	104/66	104/66
	Máximo	120	120	120/60	125/62
	Mínimo	78	78	90/64	91/65
	P-Valor	0,9569		0,9543	
10	Promedio	94,84	93,76	106/66	105/65
	Mediana	90	90	110/65	108/65
	Máximo	115	115	125/65	125/65
	Mínimo	75	75	90/60	90/50
	P-Valor	0,7320		0,7918	
15	Promedio	90,44	89,72	100/65	99/65
	Mediana	90	90	100/65	100/65
	Máximo	115	115	120/80	120/80
	Mínimo	70	70	90/55	89/69
	P-Valor	0,7781		0,5768	
30	Promedio	87,88	88,24	97/63	90/60
	Mediana	89	87	100/60	89/60
	Máximo	110	134	110/75	110/60
	Mínimo	70	65	85/60	70/40
	P-Valor	0,9235		0,0016	

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de SPSS V 18.0

ANEXO 11

Tabla 8. Tabla de Frecuencias para complicaciones según Grupos

Tiempo	Complicaciones	Midazolam		Clonidina		P-Valor
		Freq	%	Freq	%	
0	Hipotensión	0	0 %	2	8 %	0,1489
	Ninguna	25	100 %	23	92 %	
10	Sudoracion	0	0 %	1	4 %	0,3124
	Ninguna	25	100 %	24	96 %	
15	Ninguna	25	100 %	25	100 %	1
30	Ninguna	25	100 %	25	100 %	1
P-Valor		1		0,1673		

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de SPSS V 18.0