CARACTERÍSTICAS DE LA PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA

Julio Alfonso Soublett Rivas, C.I. 18.238.351, Sexo: Masculino, Email: jsoublett@hotmail.com. Telf: 0414-1851736/0212-4838620. Dirección: Hospital Universitario de Caracas .Curso de especialización en Gastroenterología.

Madeleyn Roselyn Páez Hidalgo, C.I.19.947.309, Sexo: Femenino. Email:mrph_2@hotmail.com.Telf: 0414-5864094/0258-4337563. Dirección: Hospital Universitario de Caracas. Curso de especialización en Gastroenterología.

Tutor: **Leyda Aldana**, C.I. 11.559.115. Sexo: Femenino. Email: leyda.aldana@gmail.com. Telf: 0424-2624148/0212-6719615. Dirección: Hospital Universitario de Caracas. Especialista en Gastroenterología.

RESUMEN

Objetivo: Establecer las características de peritonitis bacteriana espontánea en pacientes cirróticos con ascitis. Método: se recopiló información de historias clínicas de pacientes cirróticos con ascitis ingresados en el servicio de gastroenterología. Resultados: el motivo de consulta más frecuente fue por aumento de la circunferencia abdominal (69,2%); somnolencia (29,9%), hematemesis (23,1%). El Child-Pugh fue 78,8% tipo B y 22,2% tipo C. Se evidenció asociación estadísticas entre la coinfección y peritonitis bacteriana espontánea ($p = 0,013$). Conclusión: La PBE es una complicación frecuente y grave de los pacientes con cirrosis hepática avanzada y ascitis. El diagnóstico y tratamiento precoz han conseguido mejorar el pronóstico en los últimos años.

Palabras claves: cirrosis hepática, ascitis, peritonitis bacteriana espontánea, bacterioascitis, ascitis neutrocítica.

ABSTRACT

CHARACTERISTICS OF SPONTANEOUS BACTERIAL PERITONITIS

Objective: To Establish the characteristics of spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic patients with ascites. Method: information from medical records of cirrhotic patients with ascites admitted to the gastroenterology was collected. Results: The most frequent reason for consultation was due to increased abdominal circumference (69.2 %); somnolence (29.9 %), hematemesis (23.1 %). The Child - Pugh was 78.8 % and 22.2 % type B type C statistical association between co-infection and spontaneous bacterial peritonitis ($p = 0.013$) was demonstrated. Conclusion: The PBE is a frequent and serious complication of patients with advanced liver cirrhosis and ascites. Early diagnosis and treatment have improved prognosis in recent years.

Keywords: liver cirrhosis, portal hypertension, ascites, spontaneous bacterial peritonitis, bacterioascitis, neutrocytic ascites.